

TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT Arthrosisok műtéti kezelése ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ , #!AKTOSZTALYNEVE; 8900. ZALAEGERSZEG, ZRÍNYI U. 1. TEL: 92/507-500	BNY-ZMK-TRM-01. Verziószám: 1
--	--

Betegadatok

Beteg neve: #!NEV;	TAJ szám: #!TAJ;
Anyja neve: #!BANYJANEVE;	Születési idő: #!SZULIDO;

Cselekvőképтелenség esetén a beleegyezést gyakorló személy adatai (név, szül.idő, anyja neve, lakcím):

Rokonsági foka :

- | | |
|---|--|
| a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában
b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes
ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
bb) gyermeke, ennek hiányában
bc) szülője, ennek hiányában
bd) testvére, ennek hiányában
be) unokája | c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes
ca) gyermeke, ennek hiányában
cb) szülője, ennek hiányában
cc) testvére, ennek hiányában
cd) nagyszülője, ennek hiányában
ce) unokája |
|---|--|

1. Betegség megnevezése fődiagnózis (magyarul, esetleg latinul):

Ízületi artrózis

Az arthrosis olyan ízületi elváltozás, mely klinikailag látens folyamatként nem okoz panaszt, de a degeneratív folyamat előre haladtával, a legegyszerűbb sérülést követően aktiválódik és fájdalmassá válik. Lehet a hosszú ujjak arthrosisa, nyeregízület arthrosisa, illetve a csukló ízület arthrosisa.

2. Beavatkozás megnevezése:

Artrózisok műtéti kezelése

Hosszú ujjak arthrosisa esetén (Heberden-csomók, Bouchard- csomók, Garrod- csomók). A csomók excíziója indokolt lehet, de nem minden esetben oldja a panaszokat. Tűrhetetlen fájdalom esetén az ízület elmerovítése jön szóba.

Nyeregízületi arthrosis- A kéz leggyakoribb arthrosisa. Lehet egy vagy kétoldali. Kezdetben az ízület rögzítése, fájdalomcsillapítás javasolt. Amennyiben a panaszok továbbra is fenn állnak, műtét javasolt. A műtéti megoldások közül legújabb eljárásként a trapezium eltávolítását végezzük. Súlyos esetben az ízület elmerovítése is szóba jön.

Radiocarpalis ízület arthrosisa – az esetek 90%-ban a sajkacsont és az orsócsont közötti ízületi rész károsodik. A károsodás mértékétől és helyétől függően részleges elmerovítést is végezhetünk. A csukló teljes elmerovítése az ízület, súlyos károsodása esetén, nagymértékű fájdalom és mozgásbeszűkülés esetén jön szóba. Az ízület elmerovítése lemezzel történik, és gipszrögzítést helyezünk fel műtét után.

Beavatkozást, tájékoztatást végző orvos neve:

Beavatkozások elvégzésének tervezett időpontja

3. A javasolt vizsgálat, beavatkozás elvégzésének, ill. elmaradásának lehetséges előnyei és kockázata:

A beavatkozás/műtét előnyei:

A műtéttel az eddigi panaszok jelentősen csökkenthetők. A mozgásbeszűkülés is csökkenthető amennyiben a betegség nincs nagyon előrehaladott állapotban. Az ízületek terhelése javítható.

Javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei:

Az ízületben súlyos deformitások jöhetnek létre, az ízületi rés beszűkülése, mozgásbeszűkülés, ízületi fájdalom fokozódása. Súlyos esetekben a kéz fogó és szorító képességének csökkenéséhez vezet.

4. Lehetséges alternatív eljárások, módszerek:

Konzervatív kezelés is alkalmazható, de műtéti ellátás nélkül, a már korábban ismertetett gyógyulási szövődmények várhatók. A műtét halasztása a későbbiekben funkció károsodáshoz vezethet.

	TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT Arthrosisok műtéti kezelése ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ , #!AKTOSZTALYNEVE; 8900. ZALAEGERSZEG, ZRÍNYI U. 1. TEL: 92/507-500	BNY-ZMK-TRM-01. Verziószám: 1
--	--	--

5. A beavatkozás lehetséges szövődményei és azok kezelése:

A kezelés eredményességéért, rizikómentességéért a tudomány mai állása szerint teljes felelősséget az orvos nem vállalhat. Mint minden műtétnek, természetesen ennek is van kockázata. Műtét alatt szövődmény lehetséges: a környező anatómiai képletek, erek, inak, idegek sérülése, és súlyosabb esetben akár ismételt műtét is szükséges lehet. Ezek jelentős része azonban még a műtét alatt észlelhető, és helyrehozható. A műtét utáni szakaszban előfordulhat utóvérzés, sebkörnyéki vérömleny, sebváladékozás, felületes vagy mély lágyrész fertőzések. A gyógyulásban bekövetkezhet varrat elégtelenség, mozgászavar, nem teljes gyógyulás. Ezen szövődmények okozója lehet fennálló, meglévő kísérő betegségek (magas vérnyomás, szívbetegség, cukorbetegség stb.). Műtét után tájékoztatni fogjuk Önt természetesen a valós helyzetről és az elvégzett beavatkozásokról is.

6. A javasolt beavatkozás elvégzése után előforduló panaszok, melyek spontán vagy orvosi beavatkozásra megszűnnek:

Műtét után csak a legkritkább esetben fordul elő, hogy valakinek ne legyen kisebb-nagyobb panasza. Leggyakoribb panaszok: fájdalom, hányinger, hányás, kisebb vérzések, fáradtság, zavartság, delírium, húgyúti fertőzés, láz, székrekedés, sebszétválás, hegesedés. Ezek a panaszok általában a lábadozás idején jelentkeznek, és néhány napon belül enyhülnek vagy teljesen elmúlnak.

7. Az ellátás folyamata és várható kimenetele:

A műtét után, a kórházban tartózkodás várható időtartama 5-10 nap optimális gyógyulás esetén. A műtét előtti aktivitás visszatérése 2-4 hónap. Mindezeket természetesen az esetleges kísérő betegségek megléte, az esetleges szövődmények és a beteg általános állapota is befolyásolják.

8. A beteg kérdései és a kérdésekre adott válaszok:

A javasolt életmódról, további ellátásokról kezelőorvosomtól folyamatosan és a zárójelentésben írásban kapok tájékoztatást.

Felhatalmazom kezelő orvosaimat, hogy ha a körülmények indokolják, a műtétet / beavatkozást a szükséges mértékben, gyógyításom érdekében belátásuk szerint kiterjesszék / megváltoztassák, kivéve:

.....
Tudomásul veszem, hogy a műtét / beavatkozás eredménye előre nem garantálható és hogy a szakszerű kezelés ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények, melyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt, vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Kellő idő és információ állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen beavatkozást szeretnék.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott beavatkozások elutasítására, ezt saját kézírással írt és aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenségem esetén két tanú együttes jelenlétében megtett és azok aláírásával ellátott magánokiraton kell megtennem. Ez esetben a beavatkozás elmaradása miatt a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akik által végzendő beavatkozásokat nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. Az alapos ok nélküli visszautasítás esetén a felmerült költségeket meg kell térítenem.

Tájékoztattak arról, hogy a beavatkozás visszautasítását bármikor, alaki kötöttségek nélkül visszavonhatom. Kezelőorvosom kész engem állapotomról, illetve annak változásairól folyamatosan, megfelelően tájékoztatni.

Szóbeli tájékoztatást kaptam a fent megnevezett beavatkozásról és elolvastam a fenti betegtájékoztatót

Az általam feltett kérdésekre számomra érthető megfelelő és kielégítő tájékoztatást, illetve választ kaptam.

1. A fentiek alapján minden megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezésemet adom a megnevezett egészségügyi beavatkozáshoz, és kérem, hogy azt rajtam végezzék el.

Zalaegerszeg,

.....
tájékoztatót adó orvos
neve aláírása, pecsétje

személy

.....
beteg vagy törvényes képviselő
vagy az Eü. Tv. szerinti nyilatkozattételre jogosult

A beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévő tanú aláírása:

.....
1. tanú (név, lakcím)

.....
2. tanú (név, lakcím)

